SOURACID

PÂTE APPETENTE

SOURACID, est actif contre les rats et les souris.
La présentation en sachet d'environ 10 gr toilé, micro poreux, hydrofuge, évite la dispersion d'appât et facilite l'application.

COMPOSITION
SOURACID contient 0.005 % de DIFENACOUM et un **agent amérisant** (Répulsif pour éviter la consommation par les humains). Homologation du Ministère de l'agriculture N° 2010093.

MODE D'ACTION
SOURACID tue les rongeurs en perturbant le mécanisme de coagulation du sang.
La mort survient en quelques jours après la consommation de l'appât, sans éveiller la méfiance des rongeurs. Les rats et les souris meurent en général dans leurs terriers.
Le difénacoum est aussi actif sur les rongeurs résistants.

MODE D'EMPLOI
Disposer les sachets après les avoir déchirés dans les endroits fréquentés par les rongeurs, bien à leur portée, le long des murs et dans les recoins tranquilles, jamais en espace découvert.
Pour les rats, placer 5 à 10 sachets tous les dix mètres.
Pour les souris, placer 2 à 5 sachets tous les 3 à 5 mètres.
Vérifier et compléter les points d'appâtage régulièrement jusqu'à l'arrêt total de la consommation.
Par la suite, laisser toujours un peu d'appât aux principaux endroits pour éliminer les rats et les souris.

ANTIDOTE
Vitamine K1 (sous contrôle médical).

PRECAUTION D'EMPLOI

R22.	Nocif en cas d'ingestion.
S2	Conserver hors de la portée des enfants.
S13	Conserver à l'écart des aliments et des boissons y compris ceux pour animaux.
S20/21	Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
S44	En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
S49	Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

FABRICATION FRANCAISE

SMCI DESINFECTION / DERATISATION



DERATISATION

Les rats et les rongeurs peuvent être vecteurs de nombreuses maladies infectieuses (peste, leptospirose...). La leptospirose est une maladie redoutable qui s'attaque aux fonctions rénales. Elle se transmet suite au contact avec l'urine de rongeurs. Il n'existe aucun antidote. Elle conduit la plupart du temps à la mort!!! Si vous voyez de l'urine ou des crottes de rats sur des aliments, il est conseillé de bien les laver ou les jeter.

Les rongeurs par leurs activités, rongent "à longueur de nuit" tout ce qu'ils trouvent sur leur passage: câbles électriques, cloisons, nourritures gâchées par leurs crocs et souillées par leurs déjections. Si vous apercevez un rat, plusieurs autres sont cachés dans les environs. Leur fécondité aidant, vous serez vite envahis par des dizaines d'entre eux. Souvent la **SMCI DESINFECTION** est appelée dans ce cas là, une fois épuisées toutes les recettes maison.

Une dératisation efficace s'impose

SMCI DESINFECTION utilise de très bons raticides homologués, vendus aux seuls professionnels, en prenant soin de ne pas toucher aux animaux non visés (chats, chiens..). Afin d'effectuer un devis, un technicien de **SMCI** se rend sur les lieux infestés, fait un bilan de la situation, propose des solutions et surtout donne des conseils pour éviter une réinfestation.

DERATISATION DE COMMUNES

La société SMCI étudie toute demande de dératisation de communes.

Différentes options sont proposées :
Distribution de conditionnements spécifiques pour que la mairie puisse distribuer des sachets de raticides à la population.

- traitement des égouts
- bâtiments communaux
- décharges publiques
- berges de rivières

- vente de raticides en vrac ou à distribuer

Des prix raisonnables et des prestations de qualité font de **SMCI** une entreprise partenaire des collectivités. Pour mieux répondre à la demande des habitants de votre ville, nous vous proposons toutes nos activités.

La société **SMCI** a dans son catalogue de très bons raticides, confectionnés avec les meilleures matières actives du moment.
Ils sont confectionnés par des fabricants dont les laboratoires testent les raticides pour un résultat optimum : appétence (capacité d'attirer par les odeurs et le goût), DL 50: Quantité de matière active pour tuer 100 % de rongeurs (en mg/Kg de rongeur...), leur conservation suivant les endroits.

Nos raticides sont homologués et étiquetés  suivant les lois en vigueur.
En général tous les raticides actuels agissent après ingestion d'un appât alimentaire additionné d'une matière chimique active. Il existe deux catégories de raticides :
les "aigus" et les "chroniques".

Les "aigus"

Avant 1945, les raticides étaient souvent "aigus", c'est à dire que les appâts comportaient du poison violent qui agissait immédiatement après une seule ingestion, sur le système nerveux central. Cette méthode a été abandonnée car peu efficace sur les rongeurs. La vue d'un congénère se tordant de douleur et en prise à des convulsions incontrôlables les dissuadaient de toucher à nouveau aux appâts. Seuls subsistent à l'heure actuelle :

- La CRIMIDINE: uniquement pour les souris et à faible dose
- Le CALCIFEROL: vitamine D2 + COUMAFEN -id-
- Le COLECALCIFEROL: vitamine D3 souris + 2 rats
- Le SCILLIROSIDE: à base de composés modifiés de scille rouge maritime

Les "chroniques"

Mélangés à des appâts alimentaires, les matières actives chroniques agissent avec lenteur, de 1 à 2 semaine(s), sur les rongeurs les ayant mangés, en empêchant leur sang de coaguler d'où leur nom également de raticides "anti-coagulants". Les rongeurs peuvent en manger pendant deux semaines sans méfiance et atteindre ainsi un résultat optimum. Parmi les matières actives chroniques les plus connues voici un classement par ancienneté :

1ère génération

- Le COUMAFENE: devenu peu efficace car utilisé énormément, les rats s'y sont habitués et sont devenus résistants à ce raticide.
- Le Coumafène - Coumachlore: pour poudre de piste
- Le Coumatétralyl
- Le Diphacinone
- La Chlorophacinone

2ième génération: datant de moins de 25 ans, ce sont tous des anti-coagulants

- Le DIFENACOUM le plus récent et le plus toxique du marché, il n'est vendu qu'aux professionnels, la SMCI l'utilise dans les cas de forte infestation avec d'excellents résultats.
- Le BROMADIOLONE.
- Le BRODIFACOUM.

Toxicité des matières actives pures : DIFENACOUM.

DL 50 orale aiguë sur rat = 1.8 mg / kg.

DL 50 orale aiguë sur souris = 0.18 mg / kg.

Toxicité de la spécialité :

Quantité approximative d'appât titrant 0.005 % DIFENACOUM délivrant une DL 50 (par calcul) sur :

Rat = 30 g / kg.
Porc = 800 g / kg.
Chat = 2000 g / kg.
Poulet = 1000 g / kg.
Chien = 1000 g / kg.
Souris = 16 g / kg.
Lapin = 40 g / kg.